

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont-Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL :

60,00 F
Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 124 du 30 MAI 1979

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE (poiriers - pommiers).

Les pluies importantes enregistrées depuis le dernier traitement conseillé, ont provoqué des lessivages et les risques de contaminations primaires sont encore possibles. (à titre indicatif les premières taches de la maladie sont apparues dans certains vergers vers le 25 mai dans les régions de CLERMONT-FERRAND et de LIMOGES).

Il est nécessaire de renouveler la protection dès réception de cette note.

- Ne pas négliger la lutte contre l'Oïdium.

- Intervenir s'il y a lieu contre les chenilles défoliatrices et les pucerons.

ACARIENS (Panonychus ulmi).

L'éclosion des oeufs d'hiver est terminée dans les départements de la Haute-Vienne (VERNEUIL-SUR-VIENNE) et de la Corrèze (BAS PAYS de DRIVE).

La surveillance de ces ravageurs est à effectuer au niveau de chaque verger.

Pour les produits à utiliser, consulter le bulletin n° 122 du 16 mai.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES.

Les premières captures ont débuté le 11 mai à Clermont-Ferrand et le 17 à Limoges. Il est encore trop tôt pour intervenir.

CARPOCAPSE DES PRUNES.

Le début du vol est noté le 18 mai dans le département de la Corrèze (BAS PAYS). Aucune intervention n'est à envisager pour l'instant. Des indications concernant ce ravageur seront données ultérieurement.

PUCERON VERT DU PRUNIER.

Des attaques importantes sont constatées dans diverses régions, il est conseillé d'intervenir s'il y a lieu avec un produit aphicide.

P. JOURNET

DIRECTEUR-GÉRANT :

P. 15

GRANDES CULTURES

- CEREALES.

Maladies du feuillage.

Dans l'ensemble la situation est saine.

BLE D'HIVER.

OIDIUM.

Il est noté dans de nombreuses parcelles, en général sur les feuilles de la base. Toutefois une certaine progression du champignon est signalée dans quelques parcelles de Blé HARDI. Cette maladie est à surveiller jusqu'au stade épiaison.

Il est rappelé que le seuil d'intervention est de 5% d'attaques sur les trois dernières feuilles (début épiaison).

SEPTORIUSE.

Cette maladie est présente dans certaines parcelles. A la faveur de pluies orageuses, elle peut atteindre les feuilles supérieures. Il convient d'être vigilant et de suivre son évolution dans les prochains jours.

ORGE D'HIVER.

RHYNCHOSPORIOSE.

Le stade épiaison étant atteint et même dépassé dans la plupart des situations, une intervention ne se justifie plus contre cette maladie.

- COLZA.

La présence de pucerons condérés est notée dans diverses parcelles.

Un traitement est conseillé (stade fin de floraison, début de formation des siliques), si 2 à 3 hampes florales au m² sont envahies par les pucerons.

En cas de nécessité utiliser de préférence un produit non dangereux pour les abeilles.

Clermont-Ferrand, le 30 Mai 1979

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Adjoint au Chef de Circonscription,

A. FARGEIX.